

食道がん



好発年齢

- ・ 40代後半から増え始め、**60~70歳代**がピークとなる
- ・ 男性 **6** : 女性 **1** で「**男性**」に多い

リスクの高い人

飲酒をする

喫煙



中高年男性

お酒を飲むと
顔が赤くなる

食道がんの特徴

- ・ **早期のうちには自覚症状がほとんどない。**
- ・ 進行すると、
「熱いものが胸にしみる」、「食べ物がつかえる感じがする」
などの自覚症状が出ることがある。
- ・ 食道は壁が薄く外膜がないため、早期に浸潤・転移しやすい。
- ・ 周りに**肺・大動脈・心臓・気管**などの重要な器官があり、
浸潤すると治療が難しくなることがある。



5年生存率

- ・ 早期の場合…**約75%**以上
- ・ 遠隔転移し、最も進行した状態…**約20%**

早期に発見する事が非常に重要です

早期発見の方法

- ・ 早期の食道がんは**自覚症状がほとんどありません**。
- ・ バリウム検査では食道がんの早期発見は困難なことが多く、**胃内視鏡検査**をお勧めしています。

当院の内視鏡の特徴

- ・ 当院では「**口から**」 か 「**鼻から**」 の**どちらかご希望の検査方法を選べます**。

※二次検査や外来の方は、消化器内科医師とご相談が必要です。

- ・ 経口での内視鏡検査が苦手な方や、えずきやすい方は**経鼻内視鏡をお勧めしています**。

- ◆大阪大学消化器内科学教室より派遣された医師が検査を施行します
- ◆日本消化器内視鏡検査技師免許取得看護師が複数従事し、サポートします
- ◆検査所要時間：約5～10分（別途問診と前処置の時間がかかります）

新しい 内視鏡

【NBI内視鏡】（特殊な光を当て、血管を強調して観察する方法）

これまで発見が困難であった初期の食道がんも発見できるようになりました。当院では、全ての内視鏡室で最新のNBI機能が付いた内視鏡を備えており、随時検査が可能です。

大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビル 4階

ご予約に関するお問合せ

06-6941-8687（健診受付）

06-6941-8694（内科外来）

2



医療法人財団医親会
OBPクリニック

医親会